



www.grupolucava.com

# INFORMACIÓN GENERAL

# **DESCRIPCIÓN:**

**Ergo® STIM** es un estimulante bioactivado diseñado para promover las funciones vitales de los cultivos agrícolas. Al aplicarlo por vía foliar se incrementa el desarrollo del follaje y se estimula una mejor floración y fructificación aumentando la cantidad y calidad de las cosechas.

### **BENEFICIOS:**

- \* Estimula el desarrollo de la masa foliar de los cultivos.
- \* El ácido fólico evita el aborto de flores y favorece la buena polinización de estas, facilitando la formación de frutos de excelente calidad. Además asegura una mayor producción de frutos.
- Está enriquecido con Ácidos Fúlvicos los cuales aumentan la penetración y la traslocación de la L.Cisteína haciéndola más eficiente.
- \* Estimula enérgicamente la etapa básica de crecimiento vegetal y activa el aprovechamiento máximo de los fertilizantes, tanto del suelo como los aplicados al follaje.



# Estimulante Agrícola Líquido para Aplicación Foliar y a las Semillas

## **RECOMENDACIONES Y DOSIS**

| Dosis al Follaje   |                       |   |  |
|--|-----------------------|---|--|
| Cultivos   | Dosis                 | Recomendación   |  |
| <b>Hortalizas:</b> Calabaza, Cebolla, Col,<br>Sandía, Melón, Papa, Tomate, Chile, etc. | 250-350 cc/ha         | Hacer 3 aplicaciones: al inicio del desarrollo del cultivo, antes de la floración y en plena floración. |  |
| <b>Frutales:</b> Café, Cítricos, Manzano,<br>Nogal, Peral, Plátano, Vid, etc.          | 400-500 cc/ha         | Hacer 2 a 3 aplicaciones, la 1era al inicio de floración y las demás con 25 a 30 días de intervalo.     |  |
| <b>Anuales:</b> Fresa, Frijol, Garbanzo,<br>Soya, etc.                                 | 200-250 cc/ha         | Aplicar al inicio del desarrollo foliar, repetir a los 15 días.   |  |
| Cereales: Avena, Maíz, Sorgo, Trigo, etc.  | 150-200 cc/ha         | Una aplicación al inicio del desarrollo foliar, repetir a los 30 días.                                  |  |
| Ornamentales:  | 2 cc/litro<br>de agua | Hacer 4 aplicaciones cada 20 días. La primera al inicio de la primavera.                                |  |

Dosis a la Semilla

Mezclar 100 cc de **Ergo® STIM** en 1 a 2 litros de agua y bañar bien las semillas suficientes para una hectárea.

# MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

El producto se aplica en forma de aspersión foliar a los cultivos, para ello abra el envase, rompa el sello de seguridad, mida la cantidad a dosificar, adicione lo medido al tanque de mezclado previamente llenado con agua a la mitad de su capacidad y agite vigorosamente, llene finalmente el tanque y realice las aspersiones mediante su equipo de aplicación manual, motorizado, montado al tractor o por avión, procure lograr una completa cobertura mojando uniformemente las plantas. Siempre calibre su equipo de aplicación.

### **COMPATIBILIDAD**

**Ergo® STIM** es compatible con todos los agroquímicos, sin embargo se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de proceder a su mezcla con otros productos.

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA

| Derivados de L. Cisteína                      | %      |  |
|---|--------|--|
| Ácido N-Acetil-Tiazolidín-4-Carboxilo A.A.T.C |        |  |
| Ácido Fólico                                  | 0.10   |  |
| Inertes hasta                                 | 100.00 |  |

## **CARACTERÍSTICAS**

Tipo de Producto: Líquido

Solubilidad: 100%

**Apariencia:** Líquido Soluble, Café Oscuro

**pH:** 2.67

Densidad: 1.070

**Función del Producto:** Estimulante Agrícola Líquido para Aplicación Foliar

y a las Semillas.

# **PRESENTACIÓN**

1/4, 1/2 y 1 L.

Ficha Técnica